

水痘ワクチンと帯状疱疹ワクチンの比較表

	水痘ワクチン	帯状疱疹ワクチン（シングリックス）
帯状疱疹発生抑制効果	51. 30%	50 歳以上 97. 2%
		70 歳以上 89. 8%
帯状疱疹後神経痛抑制効果	66. 50%	50 歳以上 100%
		70 歳以上 85. 5%
効果の持続期間	5 年程度	10 年前後
接種方法/回数	皮下注射/1 回	筋肉注射/2 回
接種間隔	－	1 回目の接種から 2 か月後に 2 回目の接種を行う。 ※2 か月を超えたら 6 か月後までに 2 回目の接種を行う。
適用年齢	50 歳以上	50 歳以上
費用	7, 500 円（税込）	40, 000 円（税込） ※2 回分の費用合計（1 回分は 20, 000 円）
副反応	接種部位の痛み・発赤・腫脹 ※3 日～7 日で消失	接種部位の痛み・発赤・腫脹・倦怠感・頭痛・筋肉痛 ※3 日～7 日で消失
長所	・ 費用が安い ・ 接種回数が 1 回	・ 予防効果が高い ・ 免疫低下している方にも接種できる
短所	・ 予防効果が落ちる ・ 免疫が低下している方は接種不可	・ 費用が高い ・ 接種回数が 2 回 ・ 副反応が比較的強い